

PROTOCOLO EN CASO DE VÓMITOS

- 1) Para tratar el vómito, usar EPP (guantes, barbijo, indumentaria y calzado exclusivo). Se pueden colocar cofias en el calzado y luego descartar.
- 2) Usar polvo absorbente para solidificar o gelificar el vómito, ej.: bicarbonato de sodio, aserrín. Dejar solidificar.
- 3) Usar una pala o espátula para retirar el material absorbido en una bolsa descartable
- 4) Colocar desinfectante en el área del derrame (lejía, peróxido, peracético) dejar actuar el tiempo recomendado por el fabricante.
- 5) Secar con papel descartable y tirarlo en la bolsa plástica.
- 6) Colocar todo en bolsa plástica con cierre (incluyendo los EPP) y descartar.

PROTOCOLO EN CASO DE VÓMITOS

Bloquear el paso al área donde ocurrió el accidente.

Si el accidente ocurrió en un lugar donde se preparan alimentos, detener todas las operaciones.

Considere contaminado todo lo que esté a un radio de 7 metros en donde ocurrió el accidente.

Inicio lo **ANTES POSIBLE** la limpieza y desinfección del derrame.

Luego de limpiar y desinfectar el derrame, lavado y desinfección de manos.

Salud Ambiental



Salud siempre.

Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental Zona Andina